


Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în AMBULATORII DE SPECIALITATE, în contextul COVID-19

Măsurile de precauție care trebuie puse în aplicare de către personalul medical care îngrijește pacienții cu COVID-19 includ utilizarea PPE în mod corespunzător; acest lucru implică atât selectarea echipamentului individual de protecție adecvat, cât și echiparea și dezechiparea corespunzătoare a acestuia.




Sursa informațiilor: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



Măsuri de prevenire pentru pacienți în ambulatorii și spital, în contextul COVID-19

Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 este transmis de la om la om prin contact direct și prin picături Fluge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grija de pacienții cu COVID-19.

Măsurile de prevenire și limitare sunt esențiale atât în domeniul asistenței medicale, cât și în cel al comunității. Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ:

Efectuarea frecventă a igienei mâinilor, prin frecare cu o soluție hidro-alcoolică în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare, sau cu apă și săpun în cazul în care mâinile sunt murdare;



Evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii;




Practicarea igienei respiratorii, tușind sau strănutând în plica cotului sau într-o batistă, cu aruncarea imediată a acesteia în coșul de gunoi și apoi igienizarea mâinilor cu antiseptic pe bază de alcool sau apă și săpun;



Purtarea unei măști dacă aveți simptome respiratorii și efectuarea igienei mâinilor după îndepărțarea măștii;




Menținerea distanței sociale (minim 1 m) de la persoanele cu simptome respiratorii.



Sursa informațiilor: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020



Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în SPITALE, în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate.




Sursa informațiilor: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



Măsuri de prevenire pentru pacienți în ambulatorii și spital, în contextul COVID-19

Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 este transmis de la om la om prin contact direct și prin picături Fluge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grija de pacienții cu COVID-19.

Măsurile de prevenire și limitare sunt esențiale atât în domeniul asistenței medicale, cât și în cel al comunității. Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ:

Efectuarea frecventă a igienei mâinilor, prin frecare cu o soluție hidro-alcoolică în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare, sau cu apă și săpun în cazul în care mâinile sunt murdare;



Evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii;




Practicarea igienei respiratorii, tușind sau strănuțând în plica cotului sau într-o batistă, cu aruncarea imediată a acesteia în coșul de gunoi și apoi igienizarea mâinilor cu antiseptic pe bază de alcool sau apă și săpun;



Purtarea unei măști dacă aveți simptome respiratorii și efectuarea igienei mâinilor după îndepărțarea măștii;




Menținerea distanței sociale (minim 1 m) de la persoanele cu simptome respiratorii.




Sursa informațiilor: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020





TRIAJUL CLINICO - EPIDEMIOLOGIC AL URGENȚELOR MEDICO-CHIRURGICALE, PACIENȚI POZITIVI SAU SUSPECTI - COVID 19



Sursa informațiilor: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ